

Evoluția infecțiilor acute respiratorii și a gripei în sezonul 2014-2015

Săptămâna 2/2015 (05.01.2014-11.01.2015)

Din datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și ale Centrului Național de Gripă din INCDMI Cantacuzino reiese că în săptămâna 2/2015, în **România activitatea gripală este sporadică** (au fost raportate cazuri izolate de gripă confirmată de laborator), **de intensitate joasă**, morbiditatea prin infecții respiratorii acute încadrându-se în nivelul așteptat pentru această săptămână.

- Au fost înregistrate 6 cazuri confirmate de gripă, la persoane nevaccinate antigripal: 3 cu virus gripal tip A subtip H3 și 3 cu virus gripal tip B.
- La nivel național, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (cazuri de gripă, cazuri compatibile clinic cu gripa, infecții acute ale căilor respiratorii superioare <IACRS> și pneumonii) a fost de 77.409, de 1,9 ori mai mare față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (subraportare caracteristică sărbătorilor și vacanțelor școlare) și cu 1,9% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (75.974);
- În săptămâna 2/2015 s-au înregistrat la nivel național 39 cazuri de gripă/ cazuri compatibile clinic cu gripa <ILI>, mai multe comparativ cu cele înregistrate în săptămâna 2/2014 (26 cazuri);
- În săptămâna 2/2015 au fost înregistrate 8 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 6 mai multe față de săptămâna precedentă și cu 2 mai puține față de aceeași perioadă a sezonului precedent. **S-a înregistrat primul caz SARI confirmat ca infecție cu virus gripal (tip B).**
- **Nu a fost comunicat nici un deces prin gripă.**
- Până la data de 11.01.2015 au fost confirmate 9 cazuri de gripă:
 - 4 cazuri cu virus tip A, subtip H3 (2 din București, 2 din jud. Iași)
 - 5 cazuri cu virus tip B (din București și din jud. Ilfov, Iași, Bacău și Sibiu)

Până la data de 11.01.2015 au fost vaccinate antigripal 419.727 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății.

În buletinul săptămânal de supraveghere a gripei în Europa „WISO” respectiv „Flu News Europe”, elaborat pe baza sistemului de raportare electronică TESSy de **Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolii (ECDC)** și de **Biroul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății** se specifică că în săptămâna 2/2015, respectiv perioada 5.01.2015-11.01.2015, din cele 34 țări care au trimis rapoarte privind intensitatea activității gripei, 25 au raportat intensitate joasă, iar 9 au raportat intensitate medie.

Lipsa răspândirii geografice a fost raportată de 4 țări, răspândire sporadică de 16 țări, răspândire locală de 7 țări, răspândire regională de Germania și Scoția (UK), și răspândire largă de Finlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Suedia și Anglia (UK).

Proporția de specimene santinelă pozitive pentru gripă a fost de 30,1%.

Tipul circulant predominant în săptămâna 2/2015 a fost virusul gripal tip A, (din 1.824 tip A, 205 au fost subtip A(H1)pdm09, 543 subtip A(H3) și 1.076 ne-subtipate. Au fost identificate 380 probe pozitive cu virus gripal tip B. În Croația, Italia și

Slovenia a circulat A(H1)pdm09. În Germania, Grecia și Spania a circulat predominant virusul gripal A(H3N2). În Belgia, Irlanda și Malta a circulat predominant virusul gripal A(H3). În Portugalia a circulat predominant virusul gripal tip B.

Sezonul de gripă a început în Europa din săptămâna 1/2015.

Dintre virusurile gripale detectate de toate sistemele de supraveghere santinelă din Europa subtipul A(H3N2) circulă predominant. Același subtip circulă predominant și în America și în Asia.

Virusurile circulante A(H3N2), A(H1N1)pdm09 și B sunt susceptibile la antiviralele de tip oseltamivir și zanamivir care sunt în prezent autorizate în Europa.

Sistemul de monitorizare EuroMOMO nu a detectat în acest sezon nici o creștere a excesului de mortalitate în Europa.

Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă măsură de prevenire a îmbolnăvirilor, a complicațiilor și a deceselor prin gripă. Deși există o modificare distinctă a antigenicității virusului gripal A(H3N2) față de virusul din vaccin, având în vedere circulația concomitentă cu a celorlalte virusuri aflate în vaccinul gripal, se recomandă vaccinarea antigripală a persoanelor vulnerabile, selectate în grupele la risc, respectiv persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni sau cu factori de risc pre-existenți.