



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI CONTROL
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, 010024, București,
ROMÂNIA
Telefon: 021/ 3072.557, 667, FAX: 021 / 3072560

APROB,
MINISTRU

EUGEN NICOLĂESCU

AVIZAT,
SECRETAR DE STAT

ADRIAN PANĂ

INFORMARE

privind triajul epidemiologic efectuat după vacanța de iarnă 2013-2014

Datele colectate sunt cele transmise din teritoriu de medicii de familie din mediul rural și de cabinetele de medicină școlară din mediul urban.

Triajul efectuat se referă la un număr de 17603 unități școlare pe tipuri de colectivități (creșe, centre de plasament, grădinițe, școli generale, licee, școli profesionale și de ucenici și unități speciale), dintre care 5982 din mediul urban și 11621 din mediul rural. Astfel, din 2518168 copii înscriși (1800801 în mediul urban și 717367 în mediul rural) au fost examinați 2204372 copii (1613762 în mediul urban și 590610 în mediul rural) deci în proporție de 87,54% (89,61% în mediul urban și 82,39% în mediul rural) .

Dintre copii verificați, 28450 (1,29%) au fost depistați cu boli transmisibile, fapt pentru care au fost trimiși acasă să se trateze, urmând ca la întoarcere să fie din nou examinați. Se constată că, în mediul urban indicele de depistare este mai crescut decât cel din mediul rural, 71,81% față de 28,19%.

Angina deține primul loc în tabloul bolilor depistate. Au fost găsiți 16114 copii cu această afecțiune, 12113 (75,29%) din mediul urban și 4001 (24,71%) din mediul rural. Cei mai mulți copii depistați cu angină au fost cei din grădinițe, școli generale și licee. Dintre cazurile de angină depistate, 139 (0,86%) au fost angină cu SH, găsite în proporție de aproape 100% în mediul urban.

Următoarea pe lista bolilor transmisibile depistată este **pediculoza**. 6380 de copii au fost identificați ca fiind purtători ai acestor ectoparaziți, 3910 (61,28%) din mediul

urban și 2470 (38,72%) din mediul rural. După tratamentul cazurilor de pediculoză, la recontrol au mai fost găsiți un număr de 1072 copii (16,80%) cu pediculoză.

Micozele dețin locul trei în tabloul bolilor depistate. Dintre 1640 copii bolnavi depistați, 1191 sunt din mediul urban, în proporție de 72,62%.

Varicela ocupă locul patru, cu un număr de 402 copii depistați, dintre care 244 (60,69%) în mediul urban și 158 (39,31%) în mediul rural.

Scabia ocupă locul cinci, cu un număr de 205 copii depistați, dintre care 127 (61,95%) în mediul rural. La recontrol, au mai fost găsiți 13 copii (9 din mediul rural și 4 de la oraș).

BDA ocupă locul șase, cu un număr de 94 copii depistați, dintre care 56 (59,57%) în mediul urban și 38 (40,43%) în mediul rural.

Au mai fost identificate câte 11 cazuri de **hepatită virală** (9 în mediul urban și 2 în mediul rural), 9 cazuri de **rubeolă** (4 cazuri din mediul urban și 5 cazuri din mediul rural) 7 cazuri de **scarlatină** (6 cazuri în mediul urban și 1 în mediul rural) și 3 cazuri de **parotidită** (toate din mediul urban).

În final, au mai fost depistate 3582 cazuri de boli intitulate generic "**alte afecțiuni**", ceea ce reprezintă 12,59% din totalul bolilor depistate. Dintre acestea, 2812 cazuri (78,50%) în mediul urban și 770 cazuri (21,50%) în mediul rural.

Pentru informarea corectă a populației, vă rugăm să aprobați afișarea pe site-ul ministerului la rubrica „Control în sănătate publică” a prezentului raport.

DIRECTOR ADJUNCT

DR. SIMONA PÂRVU

Intocmit: Ec. D.Trandafir